



Fipnil Combo

Fipronil/(S)-metopren roztwór do nakrapiania



XS kot /
fretka



S 2-10 kg



M 10-20 kg



L 20-40 kg



XL > 40 kg

Promocja

3+1 za 0,01 zł

dostępna w hurtowni

Fipnil Combo

Fipronil/(S)-metopren

roztwór do nakrapiania (typu spot-on)



WSKAZANIA

U kotów: do stosowania w zwalczaniu inwazji wyłącznie pcheł lub inwazji mieszanych pcheł i kleszczy i (lub) pcheł i wszołków.

• **Eliminacja pcheł** (*Ctenocephalides spp.*). Działanie owadobójcze przeciwko nowym inwazjom dorosłych pcheł utrzymuje się przez okres 4 tygodni. Działanie przeciwko namnażaniu się pcheł przez hamowanie rozwoju jaj (działanie jajobójcze) oraz larw i poczwerek (działanie larwobójcze) powstających z jaj składanych przez dorosłe pchły, utrzymuje się do sześciu tygodni po zastosowaniu.

• **Eliminacja kleszczy** (*Ixodes ricinus, Dermacentor variabilis, Rhipicephalus sanguineus*). Działanie roztoczbójcze produktu utrzymuje się przez okres do 2 tygodni (w oparciu o dane doświadczalne).

• **Eliminacja wszołków** (*Felicola subrostratus*).

Produkt może być stosowany jako część programu leczenia alergicznego pchlego zapalenia skóry (APZS).

U fretek: do stosowania w zwalczaniu inwazji wyłącznie pcheł lub inwazji mieszanych pcheł i kleszczy.

• **Eliminacja pcheł** (*Ctenocephalides spp.*). Działanie owadobójcze przeciwko nowym inwazjom dorosłych pcheł utrzymuje się przez okres 4 tygodni. Zapobieganie namnażaniu się pcheł przez hamowanie rozwoju jaj (działanie jajobójcze) oraz larw i poczwerek (działanie larwobójcze) powstających z jaj składanych przez dorosłe pchły.

• **Eliminacja kleszczy** (*Ixodes ricinus*). Działanie roztoczbójcze produktu utrzymuje się przez okres do 4 tygodni (w oparciu o dane doświadczalne).

U psów: do stosowania w zwalczaniu inwazji wyłącznie pcheł lub inwazji mieszanych pcheł i kleszczy i (lub) pcheł i wszołków.

• **Zwalczanie inwazji pcheł** (*Ctenocephalides spp.*). Działanie owadobójcze przeciwko nowym inwazjom dorosłych pcheł utrzymuje się przez okres 8 tygodni. Działanie zapobiegające namnażaniu się pcheł przez hamowanie rozwoju jaj (działanie jajobójcze) oraz larw i poczwerek (działanie larwobójcze) powstających z jaj składanych przez dorosłe pchły, utrzymuje się do ośmiu tygodni po zastosowaniu.

• **Zwalczanie inwazji kleszczy** (*Ixodes ricinus, Dermacentor variabilis, Dermacentor reticulatus, Rhipicephalus sanguineus*). Działanie roztoczbójcze produktu utrzymuje się przez okres do 4 tygodni.

• **Zwalczanie inwazji wszołków** (*Trichodectes canis*). Produkt może być stosowany jako część programu leczenia alergicznego pchlego zapalenia skóry (APZS).

PRZECIWSKAZANIA. Ze względu na brak dostępnych danych, tego produktu nie należy stosować u kociąt poniżej 8. tygodnia życia i (lub) o wadze poniżej 1 kg. Produktu nie należy stosować u fretek poniżej 6 miesiąca życia. Ze względu na brak dostępnych danych, tego produktu nie należy stosować u szceniąt poniżej 8. tygodnia życia i (lub)

o wadze poniżej 2 kg. Nie stosować u zwierząt chorych (np. z chorobami ogólnoustrojowymi, gorączką) lub u zwierząt w trakcie rekonwalescencji. Nie stosować u królików ze względu na możliwość wystąpienia działań niepożądanych, a nawet śmierci. Ze względu na brak odpowiednich badań, nie zaleca się stosowania tego produktu u gatunków innych niż docelowe.

DAWKOWANIE, DROGA I SPOSÓB PODANIA. Przez nakrapianie. Podawać miejscowo na skórę jedną pipetkę na kota/fretkę/psa. Minimalna przerwa między podaniami wynosi 4 tygodnie.

INSTRUKCJA STOSOWANIA. Trzymać pipetkę w pozycji pionowej. Postukać w wąską część pipetki, aby upewnić się, że jej zawartość znajduje się w głównej części pipetki. Oderwać końcówkę. Rozchylić sierść na grzbiecie zwierzęcia u podstawy szyi, przed łopatkami, tak, aby skóra była widoczna. Umieścić końcówkę pipetki na skórze i ścisnąć pipetkę kilkukrotnie, aż do całkowitego jej opróżnienia. Całą zawartość pipetki należy podać w jedno miejsce, bezpośrednio na skórę.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE. Koty, psy: wśród bardzo rzadkich podejrzewanych działań niepożądanych po zastosowaniu produktu odnotowywano przejściowe reakcje skórne w miejscu podania (złuszczenie się, miejscowe wypadanie włosów, świąd, zaczerwienienie) oraz uogólniony świąd lub wypadanie włosów. Po zastosowaniu obserwowano również nadmierne ślinienie się, odwracalne objawy nerwowe (zwiększona wrażliwość na bodźce, oswialość, inne objawy nerwowe) lub wymioty. Jeżeli dojdzie do wylizywania produktu, może wystąpić krótkotrwałe nasilone ślinienie spowodowane głównie działaniem substancji pomocniczych.

OSTRZEŻENIA. Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt: Należy unikać kąpiei i (lub) zanurzenia psów w wodzie w ciągu 2 dni po podaniu produktu, a także kąpiei częstszych niż raz w tygodniu, ponieważ nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu tych czynności na skuteczność produktu. Przed zabiegiem można stosować szampony z emolientami, ale jeżeli są one stosowane co tydzień po podaniu produktu, skracają czas ochrony przed pchłami do 5 tygodni. Cotygodniowe kąpiele z użyciem leczniczego szamponu zawierającego 2% chlorheksydyny nie wpłynęły na skuteczność produktu przeciwko pchłom w prowadzonym przez 6 tygodni badaniu. Psom nie należy pozwalać na pływanie w zbiornikach wodnych przez okres 2 dni po podaniu produktu. Brak jest dostępnych danych dotyczących wpływu kąpiei i (lub) mycia szamponem na skuteczność produktu u kotów i fretek. Opierając się jednak na dostępnych danych dotyczących psów kąpanych z użyciem szamponu od 2 dni po podaniu produktu, nie zaleca się kąpienia zwierząt w ciągu 2 dni od podania produktu. Może dochodzić do wczepiania się pojedynczych kleszczy.

Z tego względu, przy niekorzystnych warunkach, nie można całkowicie wykluczyć przeniesienia chorób zakaźnych. Pchły często przechodzą ze zwierzęcia na jego koszyk, posłanie lub inne miejsca, w których zwierzę regularnie odpoczywa, takie jak dywany czy meble tapicerowane. W przypadku nasilonej inwazji, na początkowym etapie jej zwalczania, miejsca te należy potraktować odpowiednim produktem owadobójczym i regularnie je odkurzać. Nie udokumentowano potencjalnie toksycznego działania produktu na kocięta poniżej 8 tygodnia życia pozostające w kontakcie z leczoną matką. W takim przypadku należy zachować szczególną ostrożność. Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt: Unikać przedostania się produktu do oczu zwierzęcia. Należy upewnić się, że produkt zostanie podany w miejsce, z którego zwierzę nie będzie mogło go zlizać, a także upewnić się, że zwierzęta nie będą wylizywać się nawzajem po podaniu produktu. Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom: Produkt ten może wywoływać podrażnienie błon śluzowych, skóry i oczu. Z tego względu należy unikać kontaktu produktu z ustami, skórą i oczami. Jeżeli u osób podających produkt lub u leczonych zwierząt występuje nadwrażliwość na produkty owadobójcze lub alkohol, powinny one unikać kontaktu z tym produktem. Unikać kontaktu zawartości pipetki z palcami. Jeśli do tego dojdzie, należy umyć ręce wodą z mydłem. Po przypadkowym dostaniu się produktu do oczu należy przemyć je dokładnie czystą wodą. Po podaniu umyć ręce. Należy unikać dotykania leczonych zwierząt, a dzieciom nie należy pozwalać na zabawę z nimi, aż do momentu wyschnięcia miejsca podania. Z tego względu nie zaleca się podawania produktu zwierzętom w ciągu dnia, ale wczesnym wieczorem. Zwierzęta, którym niedawno podano produkt nie powinny spać z właścicielami, a w szczególności z dziećmi. Podczas podawania produktu nie należy palić, pić ani jeść. Ciąża i laktacja: Koty i psy: produkt może być stosowany w okresie ciąży. Fretki: Badania laboratoryjne prowadzone u kotów nie wykazały działania teratogenne, toksycznego dla płodu czy matki. Bezpieczeństwo produktu leczniczego weterynaryjnego stosowanego w czasie ciąży i laktacji u fretek nie zostało określone. Do stosowania jedynie po dokonaniu przez lekarza weterynarii oceny bilansu korzyści/ryzyka wynikającego ze stosowania produktu. **Karencja:** nie dotyczy. **Trwałość:** 2 lata. **Podmiot odpowiedzialny:** Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited, Loughrea, Co. Galway, Irlandia. **Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu:** 3080/21; 3081/21; 3082/21; 3083/21; 3084/21. Wydawany z przepisów lekarza – Rp. **Przed użyciem należy zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.**

Produkt	Fipronil	(S)-metopren	Waga	Zawartość opakowania
Kot, fretka Fipnil Combo 50/60 mg	50 mg	60 mg		3 x 0,5 ml
Pies Fipnil Combo 67/60,3 mg	67 mg	60,3 mg	2 – 10 kg	3 x 0,67 ml
Fipnil Combo 134/120,6 mg	134 mg	120,6 mg	10 – 20 kg	3 x 1,34 ml
Fipnil Combo 268/241,2 mg	268 mg	241,2 mg	20 – 40 kg	3 x 2,68 ml
Fipnil Combo 402/361,8 mg	402 mg	361,8 mg	> 40 kg	3 x 4,02 ml

