

Fipnil Combo

Fipronil/(S)-metopren
roztwór do nakrapiania



XS kot /
fretka



S 2-10 kg



M 10-20 kg



L 20-40 kg



XL > 40 kg

Promocja

3+1 za 0,01 zł

na każdą prezentację

dostępna w hurtowni



Chanhold

Selamektyna, roztwór do nakrapiania



S ≤ 2,5 kg



M 2,6–7,5 kg



L 7,6–10,0 kg

Fipnil Combo

WSKAZANIA

U kotów: do stosowania w zwalczaniu inwazji wyłącznie pcheł lub inwazji mieszanych pcheł i kleszczy i (lub) pcheł i wszołków.

- **Eliminacja pcheł** (*Ctenocephalides spp.*). Działanie owadobójcze przeciwko nowym inwazjom dorosłych pcheł utrzymuje się przez okres 4 tygodni. Działanie przeciwko namnażaniu się pcheł przez hamowanie rozwoju jaj (działanie jajobójcze) oraz larw i poczwerek (działanie larwobójcze) powstających z jaj składanych przez dorosłe pchły, utrzymuje się do sześciu tygodni po zastosowaniu.
- **Eliminacja kleszczy** (*Ixodes ricinus*, *Dermacentor variabilis*, *Rhipicephalus sanguineus*). Działanie rozczobójcze produktu utrzymuje się przez okres do 2 tygodni (w oparciu o dane doświadczalne).
- **Eliminacja wszołków** (*Felicola subrostratus*).

Produkt może być stosowany jako część programu leczenia alergicznego pchlego zapalenia skóry (APZS).

U frettek: do stosowania w zwalczaniu inwazji wyłącznie pcheł lub inwazji mieszanych pcheł i kleszczy.

- **Eliminacja pcheł** (*Ctenocephalides spp.*). Działanie owadobójcze przeciwko nowym inwazjom dorosłych pcheł utrzymuje się przez okres 4 tygodni. Zapobieganie namnażaniu się pcheł przez hamowanie rozwoju jaj (działanie jajobójcze) oraz larw i poczwerek (działanie larwobójcze) powstających z jaj składanych przez dorosłe pchły.
- **Zwalczanie inwazji kleszczy** (*Ixodes ricinus*). Działanie rozczobójcze produktu utrzymuje się przez okres do 4 tygodni (w oparciu o dane doświadczalne).

U psów: do stosowania w zwalczaniu inwazji wyłącznie pcheł lub inwazji mieszanych pcheł i kleszczy i (lub) pcheł i wszołków.

- **Zwalczanie inwazji pcheł** (*Ctenocephalides spp.*). Działanie owadobójcze przeciwko nowym inwazjom dorosłych pcheł utrzymuje się przez okres 8 tygodni. Działanie zapobiegające namnażaniu się pcheł przez hamowanie rozwoju jaj (działanie jajobójcze) oraz larw i poczwerek (działanie

Fipronil/(S)-metopren, roztwór do nakrapiania



larwobójcze) powstających z jaj składanych przez dorosłe pchły, utrzymuje się do ośmiu tygodni po zastosowaniu.

- **Zwalczanie inwazji kleszczy** (*Ixodes ricinus*, *Dermacentor variabilis*, *Dermacentor reticulatus*, *Rhipicephalus sanguineus*). Działanie rozczobójcze produktu utrzymuje się przez okres do 4 tygodni.

- **Zwalczanie inwazji wszołków** (*Trichodectes canis*).

Produkt może być stosowany jako część programu leczenia alergicznego pchlego zapalenia skóry (APZS).

Pełne informacje o produktach dostępne po zeskanowaniu kodu QR



Produkt	Fipronil	(S)-metopren	Waga	Zawartość opakowania
Kot, fretka				
Fipnil Combo 50/60 mg	50 mg	60 mg		3 x 0,5 ml
Pies				
Fipnil Combo 67/60,3 mg	67 mg	60,3 mg	2 – 10 kg	3 x 0,67 ml
Fipnil Combo 134/120,6 mg	134 mg	120,6 mg	10 – 20 kg	3 x 1,34 ml
Fipnil Combo 268/241,2 mg	268 mg	241,2 mg	20 – 40 kg	3 x 2,68 ml
Fipnil Combo 402/361,8 mg	402 mg	361,8 mg	> 40 kg	3 x 4,02 ml

Chanhold

Selamektyna, roztwór do nakrapiania



WSKAZANIA

Koty i psy:

- **Leczenie świerzbu usznego** (*Otodectes cynotis*)
- **Leczenie i zapobieganie infestacji pcheł** wywołanej przez *Ctenocephalides spp.* przez jeden miesiąc po jednokrotnym podaniu. Jest to spowodowane właściwościami bójczymi produktu w stosunku do postaci dorosłych, larw oraz jaj. Produkt wykazuje działanie bójcze w stosunku do jaj przez 3 tygodnie od momentu jego podania. Comiesięczne podawanie produktu zwierzętom w ciąży i laktacji ma na celu zapobieganie infestacji pcheł w miocie aż do 7 tygodnia życia, poprzez zmniejszenie liczebności populacji pcheł. Produkt można stosować jako element wspomagający w leczeniu alergicznego pchlego zapalenia skóry, a także dzięki jego właściwościom bójczym w stosunku do larw i jaj może służyć w zwalczaniu istniejących infestacji w bezpośrednim otoczeniu zwierząt.
- **Zapobieganie dirofilariozie** wywołanej przez *Dirofilaria immitis* przy regularnym comiesięcznym podawaniu. Produkt może być bezpiecznie stosowany u zwierząt zakażonych dorosłymi postaciami *Dirofilaria immitis*, jednak zaleca się, aby zgodnie z dobrą praktyką weterynaryjną wszystkie zwierzęta w wieku 6 miesięcy i starsze żyjące w krajach, w których istnieją wektory tego pasożyta, były badane w kierunku obecności dorosłych postaci *Dirofilaria immitis* przed rozpoczęciem podawania produktu. Zalecane jest, aby jako element programu profilaktycznego, okresowo badać psy w kierunku obecności dorosłych postaci robaków sercowych (*dirofilarii*), nawet w sytuacji, gdy produkt stosowany jest regularnie w odstępach miesięcznych. Produkt nie jest skuteczny przeciw dojrzałym postaciom *D. immitis*.

Koty:

- **Leczenie infestacji wszołków** (*Felicola subrostratus*)
- **Leczenie inwazji dojrzałych glist** (*Toxocara cati*)
- **Leczenie inwazji dojrzałych tęgoryjców** (*Ancylostoma tubaeformae*)

Psy:

- **Leczenie infestacji wszołków** (*Trichodectes canis*)
- **Leczenie świerzbu skórno** (wywołanego przez *Sarcoptes scabiei*)
- **Leczenie inwazji dojrzałych nicieni jelitowych** (*Toxocara canis*)

Pełne informacje o produktach dostępne po zeskanowaniu kodu QR



Produkt	Selamektyna	Waga	Zawartość opakowania
Kot			
Chanhold 15 mg	15 mg	≤ 2,5 kg	3 x 0,25 ml
Chanhold 45 mg	45 mg	2,6 – 7,5 kg	3 x 0,75 ml
Chanhold 60 mg	60 mg	7,6 – 10,0 kg	3 x 1,0 ml
odpowiednia kombinacja pipet		> 10 kg	
Pies			
Chanhold 15 mg	15 mg	≤ 2,5 kg	3 x 0,25 ml



INSTRUKCJA STOSOWANIA. Trzymać pipetkę w pozycji pionowej. Postukać w wąską część pipetki, aby upewnić się, że jej zawartość znajduje się w głównej części pipetki. Oderwać końcówkę. Rozchylić sierść na grzbiecie zwierzęcia u podstawy szyi, przed łopatkami, tak, aby skóra była widoczna. Umieścić końcówkę pipetki na skórze i ścisnąć pipetkę kilkakrotnie, aż do całkowitego jej opróżnienia. Całą zawartość pipetki należy podać w jedno miejsce, bezpośrednio na skórę.